

## Cross-sectional study of DMFT index in children and adolescents (9-18 years old) with type 1 diabetes, compared with healthy children in Ilam in 1399

### Abstract

**Introduction:** Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by high blood sugar levels (due to insufficient insulin production or insulin resistance, or both). The aim of this study was to evaluate the status of DMFT index in children and adolescents with type 1 diabetes in comparison with healthy children in Ilam province.

**Materials and Methods:** The study is a comparative study. The sample size for this study was 160 cases including all children and adolescents aged 9-18 years, 80 patients with type 1 diabetes (case group) and 80 healthy cases (control group) who were similar in age and sex. A written consent and a researcher-made questionnaire were completed by the two groups. The analysis was performed using chi-square, independent t-test, and correlation coefficient in SPSS 22 and Graphpad Prism8 software.

**Results:** The mean age of the subjects was  $13.4 \pm 3$  in the diabetic group and  $12.8 \pm 2.9$  years in the healthy group. There was no statistically significant difference between the two groups ( $P > 0.05$ ). The number of DMFT teeth in children with type 1 diabetes was significantly higher than healthy children ( $P < 0.05$ ). There was a significant relationship between the number of decayed teeth and HbA1c ( $r = 0.3$ ,  $P = 0.004$ ). Also, there is a direct and statistically significant relationship between DMFT and HbA1c ( $r = 0.36$ ,  $P = 0.001$ ).

**Conclusion:** In this study (DMFT) was higher in the diabetic group than in the healthy group. A direct correlation was also seen between HbA1C and (DMFT).

**Keywords:** DMFT index, Type 1 diabetes, caries, insulin, children

Aref Nazari<sup>1</sup>

Farhad Mohammadi<sup>2</sup>

Elham Shafiei<sup>3</sup>

Reza Najafi<sup>4</sup>

Khadijeh Abdal<sup>5\*</sup>

1-Dentistry undergraduate student, Faculty of dentistry, Ilam university of medical sciences, Ilam, Iran

2-Master in biostatistics, Non communicable diseases research center, Faculty of health, Ilam university of medical sciences, Ilam, Iran.

3-Assistant professor, Non communicable diseases research center, Ilam university of medical sciences, Ilam, Iran

4-Assistant professor, Department of pediatric endocrinology & metabolism, Faculty of Medicine, Ilam university of medical sciences, Ilam, Iran

5-Associate professor, Department of oral and maxillofacial pathology, Faculty of dentistry, Ilam university of medical sciences, Ilam, Iran

How to cite : Nazari A, Mohammadi F, Shafiei E, Najafi R, Abdal Kh, Cross sectional Study of DMFT index in children and adolescents (9-18 years old), with type 1 diabetes, compared with healthy children in Ilam in 1399: Iran J pediatric Dent 2022;17(2):47-54

بررسی مقطعی وضعیت شاخص DMFT در کودکان و نوجوانان (9-18 ساله) مبتلا به دیابت نوع 1، در مقایسه با کودکان سالم در شهر ایلام در سال 1399

چکیده

<p>عارف نظری 1 فرهاد محمدی 2 الهام شفیعی 3 رضا نجفی 4 خدیجه ابدال 5*</p>	<p><b>مقدمه:</b> دیابت ملیتوس به گروهی از بیماری های متابولیک گفته می شود که توسط افزایش سطح قندخون (به دلیل نقص در تولید انسولین و یا مقاومت به انسولین یا هر دو) شناخته می شوند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک، در مقایسه با کودکان سالم در استان ایلام می باشد.</p>
<p>1. دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</p>	<p><b>مواد و روشها:</b> مطالعه مورد نظر یک مطالعه مقایسه ای می باشد. حجم نمونه در نظر گرفته شده برای این مطالعه 160 نفر شامل همه ی کودکان و نوجوانان 9-18 ساله بودند، 80 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 (گروه مورد) و 80 نفر سالم (گروه کنترل) که از لحاظ سن و جنس مشابه هم بودند. پس از تعیین افراد شرکت کننده در طرح، رضایت نامه کتبی و پرسش نامه محقق ساخته توسط افراد دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل هم با استفاده از آزمون های آماری کای-دو، تی-مستقل، و ضریب همبستگی در نرم افزار spss و Graphpad Prism8 انجام گرفت.</p>
<p>2. کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیردار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</p>	<p><b>یافته ها:</b> میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه مبتلا به دیابت <math>13/4 \pm 3</math> و در گروه سالم <math>12/8 \pm 2/9</math> سال بود. و از نظر سن دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند (<math>P &gt; 0.05</math>). تعداد دندان های DMFT در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 به طور معنی داری بیشتر از کودکان سالم بود (<math>P &lt; 0.05</math>). بین تعداد دندانپ های پوسیده و HbA1c رابطه معنی دار وجود دارد (<math>r = 0.36</math>), (<math>P = 0.004</math>). همچنین بین DMFT و HbA1c رابطه مستقیم و از نظر آماری معنی دار است (<math>r = 0.36</math>, <math>P = 0.001</math>).</p>
<p>3. استادیار مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیردار، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</p>	<p><b>نتیجه گیری:</b> در این مطالعه (DMFT) در گروه بیماران دیابتی نسبت به گروه سالم بیشتر بود. همچنین ارتباط مستقیمی بین HbA1c و (DMFT) مشاهده شد.</p>
<p>4. استادیار غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</p>	<p><b>کلمات کلیدی:</b> شاخص DMFT، دیابت نوع 1، پوسیدگی، انسولین، کودکان</p>
<p>5. دانشیار پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</p>	

## مقدمه:

بیماری دیابت به دلیل گسترش چشمگیر در سراسر جهان یک مسئله قابل توجه است (1). دیابت یک بیماری است که با افزایش سطح قند خون (هیپرگلیسمی) مشخص می‌شود. تحقیقات ارتباط بسیار مهمی را بین هیپرگلیسمی در دیابت کنترل نشده یا ضعیف کنترل نشده و ایجاد عوارض میکرو و ماکرو عروقی مانند نارسایی کلیوی، زخم پا و قطع عضو، رتینوپاتی و بیماری‌های قلبی عروقی و عروقی نشان می‌دهد (2). علاوه بر این، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دیابت بر بافت پرعروق دهان نیز تأثیر می‌گذارد و خطر ابتلا به عوارض دهانی مانند کاهش جریان بزاق (خشکی دهان) را افزایش می‌دهد که به نوبه خود ممکن است بروز پوسیدگی دندان را افزایش دهد همچنین از دست دادن دندان‌ها، عفونت و التهاب بافت‌های اطراف دندان که شامل ژنژیویت و پریودنتیت می‌شود، افزایش می‌یابد (3-8). بیماران دیابتی مستعد ابتلا به عفونت‌های دهان و تاخیر در بهبود زخم هستند (9). سطح بالای گلوکز در حفره دهان و وضعیت نقص ایمنی در دیابت شیرین کنترل نشده، عفونت‌های باکتریایی دهان را تسهیل می‌کند (10). دیابت شایع‌ترین بیماری مزمن جهان است که به دو نوع تقسیم می‌شود. دیابت نوع 1 که سبب نابودی سلول‌های بتا در پانکراس می‌شود. در نتیجه، پانکراس هیچ انسولینی ترشح نمی‌کند (انسولین هورمونی است که بدن را قادر می‌سازد تا گلوکز موجود در غذا را به انرژی تبدیل کند). چنانچه قند موجود در خون نتواند وارد سلول‌ها شود، به مرور زمان قند خون بالا رفته و موجب افزایش قند خون و تأثیرات جبران ناپذیر بر روی اعضای مختلف بدن می‌شود (11). هیپرگلیسمی به عنوان یک ویژگی بیوشیمیایی اصلی این بیماری غدد درون ریز است (12). شدت و پیشرفت تخریب پریودنتال و التهاب لثه در افراد دیابتیک بیشتر است و بیماری پریودنتال یکی از دلایل اصلی از دست رفتن دندان در افراد مبتلا به دیابت می‌باشد. عوارض دهانی دیابت شامل: کاندیدیازیس، پوسیدگی دندان، از دست رفتن دندان و لثه، لیکن پلان، سندرم سوزش دهان، پریودنتیت، اختلال عملکرد بزاق و خشکی دهان و اختلالات چشایی و ... می‌باشد. عارضه خشکی دهان ممکن است به علت تشنگی (تظاهر شایع در بیماری دیابت)، اختلالات حسی در دهان، کم‌آبی، کاهش جریان بزاق و یا تغییر ترکیب بزاق ایجاد شود. همچنین کاهش اجزای بزاق در این افراد توانایی حمایت از مواد معدنی ساختار دندان را کاهش می‌دهد و مقاومت در برابر فرآیند دمیترالیزاسیون در روند پوسیدگی کاهش پیدا می‌کند و به این ترتیب محیط مناسب برای پیشرفت پوسیدگی ایجاد می‌شود (13). شیوع و بروز دیابت نوع 1 به ویژه در کشورهای اروپایی رو به افزایش است (14). پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری عفونی مزمن است و یک چالش بین‌المللی برای سلامت عمومی به ویژه در کودکان خردسال به وجود آورده است (15). عواقب آن می‌تواند منجر به دریافت غذای ضعیف، عملکرد ضعیف در مدرسه و مشکلات سلامت روان شود که می‌تواند بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد و بار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای خانواده‌ها داشته باشد (16). ارزیابی پوسیدگی بالینی با شاخص (DMFT) مشخص می‌شود که در آن پوسیدگی (Decay)، دندان از دست رفته (Missing)، دندان پر یا ترمیم شده (Filling) و دندانها (Teeth) می‌باشد که بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی تشخیص داده می‌شود (17). اگرچه پوسیدگی دندان رو به کاهش بوده، اما یک نگرانی ملی در ایالات متحده بین سال‌های 2001 تا 2012 نشان داد، که تقریباً 37 درصد از کودکان 2 تا 8 ساله و 60 درصد از نوجوانان 12 تا 19 ساله پوسیدگی دندان را در دندان‌های اصلی خود تجربه کرده‌اند (18). در ایران (استان همدان) بررسی‌ای در مورد وضعیت سلامت دهان و دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 در مقایسه با کودکان سالم در سال 1392 انجام گرفت و مشخص شد که، اثرات مخرب دیابت بر سلامت دهان و دندان در کنار سایر عوارض جانبی آن می‌تواند در افزایش پوسیدگی دندان و التهاب لثه مؤثر باشد (19). غربالگری و درمان پیشگیرانه برای جلوگیری از پوسیدگی دندان قبل از غیر قابل درمان شدن در جمعیت پرخطر ضروری است. با این حال، شیوع دقیق پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1، به ویژه در افرادی که کنترل متابولیک ضعیفی دارند، بحث‌برانگیز است (20-22). انتظار می‌رود شیوع پوسیدگی در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی به دلیل افزایش سطح گلوکز در بزاق بیشتر باشد و از طرف دیگر محدودیت مصرف گلوکز در رژیم غذایی بیماران دیابتی می‌تواند دلیلی برای توجیه کاهش پوسیدگی دندان در آن‌ها باشد (23). مطالعات قبلی نشان داده است که شیوع پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان بین 36 درصد در ایران و 92 درصد در شیلی متغیر است (24، 25). لذا با توجه به اینکه آمار دقیقی از میزان پوسیدگی دندان (که شایع‌ترین بیماری عفونی دنیا می‌باشد) در افراد دیابتی، در شهر ایلام در دسترس نمی‌باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1، در مقایسه با کودکان سالم در شهر ایلام در سال 1398 انجام گرفت.

## مواد و روش‌ها:

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می‌باشد که، پس از هماهنگی با مسئولین مراکز درمانی دیابت (برای تعیین گروه مورد) و مسئولین دانشکده دندانپزشکی (برای تعیین گروه کنترل) در شهر ایلام انجام گرفت. گروه مورد-شاهدی به صورت تصادفی از کلیه کودکان و نوجوانان 9 تا 18 ساله انتخاب شد. که هر دو گروه از نظر سن و جنس شباهت دارند. گروه مورد شامل کلیه کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 هستند، که به مراکز درمانی دیابت شهر ایلام مراجعه داشتند. همچنین گروه شاهد نیز کلیه کودکان و نوجوانان سالم بودند، که برای معاینات و معالجه‌های دندانپزشکی به کلینیک دندانپزشکی علوم پزشکی ایلام مراجعه داشتند.

## مجله دندانپزشکی کودکان ایران بهار و تابستان 1401: دوره 17 (2)

معیارهای ورود به مطالعه برای گروه مورد: گروه سنی 9 تا 18 سال، ابتلا به دیابت نوع 1 حداقل به مدت یکسال، معیارهای ورود برای گروه شاهد: گروه سنی 9 تا 18 سال، سالم بودن و عدم ابتلا به بیماری‌های سیستمیک و معیارهای خروج از مطالعه: مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، باردار بودن، ابتلا به بیماری‌های مادرزادی درگیر کننده مینا و عاج، مشکلات خونی و انعقادی و دیگر بیماری‌های سیستمیک، استفاده از داروهایی با عوارض خشکی دهان بودند.

پس از تعیین افراد شرکت کننده برای انجام مطالعه رضایت نامه کتبی و پرسشنامه محقق ساخته توسط افراد دو گروه تکمیل شد. البته قبل از تحویل پرسشنامه به بیماران، روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط دو نفر از متخصصان دندانپزشکی تاییدگردید.

پرسشنامه از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت اول شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران مثل سن، جنس و میزان تحصیلات هر فرد بود. قسمت دوم شامل سابقه بیماری و رعایت بهداشت دهان بیماران می‌باشد که در آن تعداد دفعات استفاده از مسواک، نخ دندان، دهانشویه و مراجعه به دندانپزشک مشخص شد. قسمت سوم پرسشنامه که فرم معاینه می‌باشد، اطلاعات مربوط به معاینات دندان‌های هر بیمار ثبت شد.

بیماران پس از معاینه بوسیله چراغ قوه و آبسلانگ، برای تکمیل فرم معاینه از نظر شاخص (DMFT) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه‌ها و فرم معاینه، توسط نرم افزار آماری SPSS22 و Graphpad prism با استفاده از آزمون‌های t مستقل، کای دو و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### یافته‌ها:

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شاخص DMFT در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1، در مقایسه با کودکان سالم در شهر ایلام در سال 1399 بر روی 160 نفر (80 نفر بیمار و 80 نفر سالم) از کودکان و نوجوانان شهر ایلام انجام شد. میانگین مدت زمان مصرف دارو در مبتلایان به دیابت  $4/5 \pm 2/8$  سال بود. میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه مبتلا به دیابت  $13/4 \pm 3$  و در گروه سالم  $12/8 \pm 2/9$  سال بود. و از نظر سن دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند ( $P > 0.05$ ). سایر نتایج در جداول 1 و 2 و نمودار 1 گزارش شده است.

جدول 1: مقایسه متغیرهای دموگرافیک و بالینی در گروه‌های مبتلا به دیابت نوع 1 و سالم

متغیر	P-value		
	مبتلا تعداد	سالم تعداد	
جنس	مذکر 39 (48%/8)	مذکر 46 (57%/5)	
	مونث 41 (52%/2)	مونث 34 (42%/5)	
تحصیلات	ابتدایی 28 (35%)	ابتدایی 48 (60%)	
	راهنمایی 16 (20%)	راهنمایی 13 (16%/2)	
	دبیرستان 36 (45%)	دبیرستان 19 (23%/8)	
	بهداشت دهان		
بهداشت دهان	مسواک 44 (55%)	مسواک 50 (62%/5)	
	نخ دندان 1 (1%/2)	نخ دندان 1 (1%/2)	
	دهانشویه 1 (1%/2)	دهانشویه 1 (1%/2)	
	مسواک+نخ دندان 14 (17%/6)	مسواک+نخ دندان 5 (6%/3)	
	مسواک+نخ دندان+دهانشویه 10 (12%/5)	مسواک+نخ دندان+دهانشویه 1 (1%/2)	
	هیچکدام 10 (12%/5)	هیچکدام 22 (27%/6)	
	معاینات دوره‌ای دندان	3 ماه 1 (1%/5)	3 ماه 1 (1%/2)
		4 ماه 4 (5%)	4 ماه 10 (12%/5)
یکسال 33 (41%/4)		یکسال 42 (52%/5)	
هرگز 42 (52%/5)		هرگز 27 (33%/6)	


بر اساس نتایج جدول 1، تفاوت آماری معنی داری بین کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک و کودکان سالم از نظر متغیرهای دموگرافیک و بالینی وجود ندارد ( $P>0.05$ ).

جدول 2: مقایسه میانگین تعداد دندان‌های پوسیده، پرشده و از دست رفته در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 و کودکان سالم در شهر ایلام در سال 1399

متغیر	مبتلا	سالم	سطح معنی‌داری
دندان‌های پوسیده	$4 \pm 2/3$	$5/2 \pm 2/2$	$<0.001$
دندان‌های پرشده	$1/4 \pm 2$	$0/65 \pm 0/95$	$0/003$
دندان‌های از دست رفته	$0/16 \pm 0/18$	$0/28 \pm 0/74$	$0/21$
دندان‌های (DMFT)	$5/6 \pm 3/2$	$3/4 \pm 3$	$<0.001$

بر اساس نتایج جدول شماره 2، از نظر میانگین تعداد دندان‌های پوسیده، میانگین تعداد دندان‌های پر شده و مجموع دندان‌های پوسیده، پرشده و از دست رفته DMFT تفاوت آماری معنی‌داری بین کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 و کودکان سالم وجود دارد، یعنی شاخص (DMFT) در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 به طور معنی‌داری بیشتر از کودکان سالم می‌باشد ( $P<0.05$ ) اما از نظر میانگین تعداد دندان‌های از دست رفته تفاوت آماری معنی‌داری بین کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک و کودکان سالم وجود ندارد ( $P>0.05$ ).

نمودار 1: مقایسه رابطه تعداد دندان‌های پوسیده، پرشده، از دست رفته و HbA1c در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک در شهر ایلام سال 1399



بر اساس نتایج نمودار، بین تعداد دندان های پوسیده و سطح (HbA1c) از نظر آماری تفاوت معنی داری ضعیفی وجود دارد. ( $r=0.32, P=0.004$ ) همچنین بین مجموع دندان های پوسیده، پر شده و از دست رفته (DMFT) و HbA1c رابطه آماری معنی داری وجود دارد ( $r=0.36, P=0.001$ ).

## بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص MDFT تفاوت آماری معنی داری در دو گروه داشت. در مطالعه بصیر و همکاران که در سال 2008 انجام گرفت، نتایج نشان داد که DMFT تفاوت معنی داری بین افراد دیابتی و سالم ندارد. که با مطالعه ما همخوانی نداشت اما از نظر دفعات مسواک زدن و استفاده از دهان شویه ها با مطالعه حاضر همسو بود (26). مطالعه Razavi و همکاران در مورد وضعیت بهداشت و سلامت دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 نشان داد که، بین دو گروه از نظر شاخص (MDFT) معناداری وجود ندارد. اما در مطالعه حاضر تفاوت معناداری مشاهده شد (21). مطالعه Geetha و همکاران با مطالعه حاضر از نظر وضعیت سلامت دهان و دندان و دانش در میان کودکان و نوجوانان دیابت نوع 1 همسو نبود به این شکل که میانگین تعداد DMFT در بیماران دیابتی در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود (27). مطالعه Valle و همکاران که در سال 2011 با هدف مقایسه وضعیت سلامت دهان کودکان دیابتی و غیر دیابتی از پورتوریکو: یک مطالعه مورد شاهدهی انجام دادند، به این نتایج رسیدند که تفاوت معنی داری در تعداد دندان های پوسیده کودکان دیابتی و غیر دیابتی مشاهده شد (28). که از این لحاظ با مطالعه حاضر همسو بود. مطالعه دیرگی در سال 2018 با هدف تاثیر دیابت نوع 1 بر پوسیدگی دندان انجام گرفت نتیجه اینگونه شد که DMFT در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود که با نتیجه مطالعه حاضر همسو بود (29). مطالعه دیگری که در جنوب هند با هدف ارزیابی پوسیدگی دندان در میان گروهی از بیماران دیابت نوع 1 و افراد سالم انجام گرفت نتیجه بر این شد که پوسیدگی دندان های دایمی در گروه دیابتی نسبت به افراد سالم بیشتر بود که از این لحاظ با مطالعه ما همسو بود (30). حال مطالعه دیگری که با هدف ارتباط پوسیدگی دندان، دیابت شیرین و میکروبیوتای دهان در بیماران دیابتی انجام گرفت مشاهده گردید که پوسیدگی دندان و دیابت شیرین با هم ارتباط دارند، در نتیجه با مطالعه ما همسو بود (31). در مصر مطالعه ای با هدف ارزیابی سلامت دهان و دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 انجام گرفت. مشاهده شد که شاخص DMFT و سطح HbA1c همبستگی مثبت داشت (32). که با نتیجه مطالعه ما همسو بود. همچنین مطالعه دیگری که با هدف پوسیدگی دندان و وضعیت پریدنتال در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 انجام گرفت با مطالعه ما همسو بود (33).

## نتیجه گیری :

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین شاخص DMFT با میزان بیان HbA1c و همچنین شاخص DMFT در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی از نظر آماری اختلاف معناداری وجود دارد. با توجه به مهم بودن بحث بهداشت دهان و دندان به ویژه در بیماران مبتلا به دیابت، پیشنهاد می شود که مطالعات مشابهی با تعداد نمونه های بیشتر صورت بگیرد تا بر اساس یافته های به دست آمده بتوانیم برنامه ریزی های مفید و کارآمدی، در حوزه آموزش بهداشت دهان و دندان برای این گروه از بیماران انجام دهیم.

## منابع

1. Munir A, Malik SI, Aslam S, Mehmood A, Amjad S, Malik K, et al. Medicinal plants are effective inhibitors of type I and II diabetes. *Pharmacophore*. 2018;9(5):1-7.
2. Fowler MJ. Microvascular and macrovascular complications of diabetes. *Clin diabetes*. 2008;26(2):77-82.
3. Lessa LS, Pires PD, Ceretta RA, Becker IR, Ceretta LB, Tuon L, et al. Meta-analysis of prevalence of xerostomia in diabetes mellitus. *Int Arch Med*. 2015;8:1-13.
4. Song I-S, Han K, Park Y-M, Ryu J-J, Park J-B. Type 2 diabetes as a risk indicator for dental caries in Korean adults: the 2011-2012 Korea national health and nutrition examination survey. *Community dent health*. 2017;34(3):169-175.

- .5 Monje A, Catena A, Borgnakke WS. Association between diabetes mellitus/hyperglycaemia and peri-implant diseases: Systematic review and meta-analysis. *J clin periodontol*. 2017;44(6):636-48.
- .6 Lalla E, Cheng B, Lal S, Tucker S, Greenberg E, Goland R, et al. Periodontal changes in children and adolescents with diabetes: a case-control study. *Diabetes care*. 2006;29(2):295-9.
- .7 Chávarry NGM, Vettore MV, Sansone C, Sheiham A. The relationship between diabetes mellitus and destructive periodontal disease: a meta-analysis. *Oral Health Prev Dent*. 2009;7(2):107-27.
- .8 Khader YS, Dauod AS, El-Qaderi SS, Alkafajei A, Batayha WQ. Periodontal status of diabetics compared with nondiabetics: a meta-analysis. *J Diabetes Complications*. 2006;20(1):59-68.
- .9 Mohanty S, Mohanty N, Rath S. Analysis of oral health complications in diabetic patients—A diagnostic perspective. *J Oral Res*. 2018;7(8):278-81.
- .10 Indurkar MS, Maurya AS, Indurkar S. Oral manifestations of diabetes. *Clinical Diabetes*. 2016;34(1):54-7.
- .11 Domenyuk DA, Zelensky VA, Dmitrienko SV, Anfinogenova OI, Pushkin S. Peculiarities of phosphorine calcium exchange in the pathogenesis of dental caries in children with diabetes of the first type. *Entomology and Applied Science Letters*. 2018;5(4):49-64.
- .12 Ismail AF, McGrath CP, Yiu CK. Oral health status of children with type 1 diabetes: a comparative study. *J Pediatr Endocrinol Metabol*. 2017;30(11):1155-9.
- .13 Jahanirinejad M, Arian Kia A, Shahbazian HB, Kaabi N. Community Periodontal Index of Treatment Needs Assessment of Periodontal Disease in Type 2 Diabetic Patients Compared to Nondiabetic Patients Referred to Ahvaz Golestan Hospital in 2016-2017. *Jondishapur Sci Med J*. 2018;17(3):295-302.
- .14 Fox DA, Islam N, Sutherland J, Reimer K, Amed S. Type 1 diabetes incidence and prevalence trends in a cohort of Canadian children and youth. *Pediatr Diabetes*. 2018;19(3):501–5.
- .15 Colak H, Dulgergil CT, Dalli M, Hamidi MM. Early childhood caries update: a review of causes, diagnoses, and treatments. *J Nat Sci Biol Med*. 2013;4(1):29–38.
- .16 Ganesh A, Muthu MS, Mohan A, Kirubakaran R. Prevalence of early childhood caries in India - a systematic review. *Indian J Pediatr*. 2018;86(3):276–86.
- .17 World Health Organization. *Oral Health Surveys: Basic Methods* (5th edn.). Geneva: World Health Organization; 2013.
- .18 Dye BA, Thornton-Evans G, Li X, Iafolla TJ. Dental caries and sealant prevalence in children and adolescents in the United States, 2011-2012. *NCHS Data Brief*. 2015;(191):1–8. <https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db191.pdf>.
- .19 Rafatjou R, Razavi Z, Khalili M, Farhadian M. Oral health status in 5-18 years old children and adolescent with type 1 diabetes compared with healthy group in Hamadan, Iran 2013-2014. *Journal of Dental Medicine*. 2016;29(2):109-15.
- .20 Coelho A, Paula A, Mota M, Laranjo M, Abrantes M, Carrilho F, Ferreira M, Silva M, Botelho F, Carrilho E. Dental caries and bacterial load in saliva and dental biofilm of type 1 diabetics on continuous subcutaneous insulin infusion. *J Appl Oral Sci*. 2018;26:e20170500.
- .21 Rafatjou R, Razavi Z, Tayebi S, Khalili M, Farhadian M. Dental health status and hygiene in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. *J Res Health Sci*. 2016;16(3):122–6.
- .22 Carneiro VL, Fraiz FC, Ferreira Fde M, Pintarelli TP, Oliveira AC, Boguszewski MC. The influence of glycemic control on the oral health of children and adolescents with diabetes mellitus type 1. *Arch Endocrinol Metab*. 2015;59(6):535–40.
- .23 Kamran S, Moradian H, Yazdan BE. Comparison of the mean DMF index in type I diabetic and healthy children. *J Dent (Shiraz)*. 2019;20(1):61-65.

- .24 Alavi AA, Amirhakimi E, Karami B: The prevalence of dental caries in 5-18-years-old insulin-dependent diabetics of Fars Province, Southern Iran. *Arch Iran Med*. 2006, 9 (3): 254-260.
- .25 Miranda OX, Troncoso PJ, Rodríguez SC, Aravena TP, Jiménez Del RP. Dental caries and hygiene oral index in children with diabetes mellitus type 1. *Rev Chil Pediatr*. 2013;84(5):527-31.
- .26 Basir L, Amani R, KHaneh Masjedi MA, Ahangarpour F. Comparison of diet among diabetic type 1 and non-diabetic children and its effect on dental caries. *Jondishapur Sci Med J* 2008;7(2):181-7.
- .27 Geetha S, Pramila M, Jain K, Suresh C. Oral health status and knowledge among 10-15years old type 1 diabetes mellitus children and adolescents in Bengaluru. *Indian J Dent Res*.. 2019;30(1):80-6.
- .28 del Valle LML, Ocasio-López C. Comparing the oral health status of diabetic and non-diabetic children from Puerto Rico: a case-control pilot study. *P R Health Sci J*. 2011;30(3):123-7.
- .29 Ferizi L, Dragidella F, Spahiu L, Begzati A, Kotori V. The influence of type 1 diabetes mellitus on dental caries and salivary composition. *Int J dent*. 2018: p. 5780916.
- .30 Babu KG, Subramaniam P, Kaje K. Assessment of dental caries and gingival status among a group of type 1 diabetes mellitus and healthy children of South India—a comparative study. *J Pediatr Endocrinol Metab*. 2018;31(12):1305-10.
- .31 Latti BR, Kalburge JV, Birajdar SB, Latti RG. Evaluation of relationship between dental caries, diabetes mellitus and oral microbiota in diabetics. *J oral maxillofac pathol*.2018;22(2):282.
- .32 Awad M, Attia N, Salem N. Oral Health Assessment in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. *Egyptian Dental Journal*. 2021;67(4):2853-64.
- .33 Pachoński M, Jarosz-Chobot P, Koczor-Rozmus A, Łanowy P, Mocny-Pachońska K. Dental caries and periodontal status in children with type 1 diabetes mellitus. *Pediatr Endocrinol Diabetes Metab* 2020;26(1):39-44.